Def. Einsetzen Implantatprothetik
Bedingt abnehmbarer Zahnersatz

Materialempfehlung:

Wasserstoffperoxidlösung 3% (Apotheke)

Gentamicin-POS 5,0mg/g Augensalbe Wirkstoff: Gentamicinsulfat PZN: 2498636

Opotow Trial Cement
Hersteller: Waterpik PZN: 336 920

Einwegspritze: Omnifix 5ml Luer Lock Hersteller: B. Braun

Einwegspritze: Omnifix 2ml Luer Lock Hersteller: B. Braun

Einwegkanüle: Mirajet stumpf/gelb 9x22mm Hersteller: Hager & Werken

Arbeitschritte:

Wasserstoffperoxidlösung 3%:
- Aufziehen in Einwegspritze 5ml + stumpfe Kanüle
- Spülen der Implantate

Gentamicin-POS 5,0mg/g Augensalbe:
- Aufziehen in Einwegspritze 2ml + stumpfe Kanüle
- Gentamicin-POS in den Innenraum des zweiteiligen Implantates einbringen
- vorgesehenen Aufbau einschrauben
- Okklusalschraube mit Drehmomentratchet 28 Ncm anziehen

Opotow Base + Opotow Catalyst + Gentamicin-POS Augensalbe:
- **3:3:1** anmischen in Lumen der oral verschraubten Implantatbrücke oder -krone füllen
- Implantatkrone/n auf vorgesehenen Aufbau/ten fest aufsetzen
- linguale Verschraubung zügig eindrehen
- 10 min. aushärten lassen
- Zementüberreste gründlich versäubern
- nicht bei natürlichen Zahnpfeilern anwenden!

Der gesamte Vorgang einschließlich einer gründlichen Reinigung der Suprastruktur sollte spätestens alle 5 Jahre wiederholt werden.